

SARAMPIÓN, RUBEOLA Y POLIOMIELITIS

Campaña Nacional de Vacunación para niños de 1 a 4 años

Con el propósito de consolidar la eliminación de enfermedades prevenibles por vacunas, como recomienda la OMS, se realizará en nuestro país la **Campaña Nacional de Vacunación de Seguimiento contra Sarampión, Rubéola y Poliomielitis, desde el 1º de septiembre al 31 de octubre del 2014 para la población de 1 a 4 años, con la aplicación de una dosis extra de vacuna doble viral (SR) y una dosis extra de Sabin.**

Las campañas de seguimiento se deben implementar cuando la población susceptible se acerca a una cohorte de recién nacidos vivos. En estas campañas se vacuna a niños que nunca fueron vacunados y a aquellos vacunados que pueden no haber tenido una buena respuesta inmunitaria.

POLIOMIELITIS

De acuerdo al reporte de la OMS en diciembre 2013 se reportaron 355 casos de polio en países endémicos.

Hay países como Pakistán, Nigeria y Afganistán con polio endémica y 12 países con brotes de polio.

Uno de los fundamentos de las realizaciones de las campañas con Sabin es tratar de evitar la reintroducción del virus hacia Argentina desde países con circulación de polio.

La posibilidad de reintroducción de una enfermedad infecciosa prevenible por vacunas en una población libre de la enfermedad incluye tres aspectos:

1. La existencia de una fuente de importación.
2. El agente etiológico.
3. Susceptibilidad para la infección en la población

Considerando las zonas de bajas coberturas con cuarta dosis en nuestro país, existiría el riesgo de reintroducción del poliovirus salvaje o la aparición de brotes de virus Sabin derivados, por lo cual es necesaria la realización de la Campaña.

Población objetivo para SR (Doble viral)

- Niños de 13 meses a 4 años (4 años 11 meses y 29 días), previamente vacunados con triple viral.

Población objetivo con SRP (Triple viral)

- **Niños de 12 a 13 meses**
- Niños de 13 meses a 4 años (4 años 11 meses y 29 días) , que no hayan recibido SRP como vacunación de calendario .

Los niños que hubieran recibido antes de la Campaña como parte del calendario al año de vida la vacuna SR en lugar de SRP deberán recibir SRP en el período de Campaña.

Población objetivo para Sabin

- Niños de 12 meses a 4 años (4 años 11 meses y 29 días), no convivientes con inmunodeficientes.

Población objetivo para IPV (Salk)

Niños de 12 meses a 4 años(4 años 11 meses y 29 días), con:

- Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas
- Inmunosupresión por drogas o corticoides (2mg/kg/d por más de 14 días)
- Trasplantados de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos
- Enfermedad oncológica
- Convivientes de pacientes con enfermedad inmunosupresora

Importante: los niños vacunados en el sector privado antes del año con vacuna con componente IPV (séxtuple) y con esquema completo, deben recibir una dosis extra de vacuna OPV. Para recibir la dosis extra no es necesario respetar ningún intervalo mínimo entre la administración de IPV /OPV, pudiendo administrarse en la misma oportunidad.

SRP/SR contraindicada en

- Inmunodeficiencia grave
- Inmunodeficiencia congénita
- Enfermedad oncohematológica (evaluar con especialista)
- Tratamiento inmunosupresor
- Infección por VIH/SIDA con CD4<15%.
- Inmunodeficiencias humorales bajo tratamiento sustitutivo con Inmunoglobulina EV.

Vacunacion campaña población objeto y definición de acciones

Población	Vacunas a aplicar
Niños de 12 a 13 meses	SRP y SABIN (dosis extra) Citar para aplicar dosis de SR , con un intervalo mínimo de 4 semanas .
Niños de 13 meses a 4 años inclusive con esquema completo	SR y SABIN
Niños de 13 meses a 4 años inclusive con esquema incompleto o dosis previa de SR en vez de SRP.	SRP y SABIN Citar para aplicar dosis extra SR y/o OPV , respetando el intervalo de 4 semanas completando esquemas incompletos

Ministerio de Salud

Campana de vacunación

<http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/445>